



## Protocole en cas de maladie

### Définitions :

**Maladie** : Cessation ou perturbation des fonctions, systèmes ou organes corporels.

**Guérison clinique** : Disparition ou diminution très nette des symptômes qui ont permis de reconnaître la maladie.

**Epidémie** : Dès que 5 cas se présentent.

### Critères :

#### **Température :**

- A l'arrivée le matin : si l'enfant a de la fièvre (38,5°C voir 38°C pour les plus petits) il ne peut pas venir à la crèche.
- Dans la journée : si l'enfant a 38,5°C (voir 38°C pour les plus petits) contacter les parents. Les parents s'organisent pour venir chercher leur enfant. En cas d'absence des parents, la personne de contact sera jointe pour venir chercher l'enfant. Les parents doivent s'arranger pour venir chercher l'enfant au plus vite ou mandater quelqu'un et nous avertir.

Un enfant qui présente de la fièvre montre déjà qu'il n'est pas dans son état normal.

### Maladies spécifiques :

<b>Maladie</b>	<b>Fréquentation crèche</b>	<b>Symptômes</b>
Angine à streptocoques	24 heures après la 1 <sup>ère</sup> prise d'antibiotique	
Angine virale	Guérison clinique sans fièvre	
Coqueluche	Après 5 <sup>ème</sup> jour du traitement antibiotique (ou 21 <sup>ème</sup> jour sans traitement)	
Otite	24 heures après la 1 <sup>ère</sup> prise d'antibiotiques	
Oreillons	7 jours après tuméfaction	
Rubéole	10 jours après l'éruption	
Varicelle	Dès vésicules toutes sèches soit minimum 7 jours	
Rougeole	10 jours après la fièvre	
Conjonctivite allergique	Traitement antihistaminique : fréquentation possible	Yeux rouges et secs
Conjonctivite bactérienne	Gouttes antibiotiques : 24 heures après le début du traitement	Yeux rouges et liquide jaune purulent. Conséquence d'un rhume, fièvre
Conjonctivite virale	24 heures après le début du traitement (pommade ou gouttes à la cortisone) + guérison clinique	Larme+ yeux rouges
Hépatite virale A	Guérison clinique ( ou 7 <sup>ème</sup> jour après le début de la jaunisse)	
Herpès primaire (gingivostomatite)	Guérison clinique	
Impétigo	24 heures après le début du traitement antibiotique	
Méningite bactérienne ou virale	Guérison clinique	
Mycose du cuir chevelu	Dès le début du traitement	
Gastrite, gastroentérite	Guérison clinique soit 3 jours sans diarrhées ni vomissements	Diarrhées+ vomissements avec ou sans température

**Autres maladies traitées par antibiotiques :**

L'enfant peut revenir à la crèche 24 heures après le début du traitement. Il se peut qu'un certificat médical qui confirme que l'enfant est suffisamment en bonne santé pour revenir dans une collectivité soit demandé aux parents.

### **Poux :**

Dès que le premier shampoing a été fait.

### **Informations :**

Les enfants présentant d'autres maladies peuvent fréquenter la crèche. Il est bien sûr évident que l'état général de l'enfant sera pris en considération. Si l'enfant n'a pas de température mais qu'il n'est pas bien (l'enfant se plaint, ne se sent pas bien, reste couché, gros rhume, yeux qui coulent, si l'enfant est grinche, etc.) le repos à domicile peut faire partie du traitement, être bénéfique et permettre à l'enfant de mieux se rétablir.

Aucun médicament n'est administré par les éducatrices sans l'accord des parents. Ces derniers sont tenus d'avertir l'équipe éducative s'ils ont administré un médicament à leur enfant avant de l'amener à la crèche.

### **Liste des maladies nécessitant obligatoirement une information aux éducatrices :**

- Muguet buccal pour les bébés
- Rubéole
- Otite
- Mycose cutanée
- Oxyvrose, vers, parasites
- Verrue plantaire
- Ainsi que toutes les maladies mentionnées ci-dessus dans le tableau.

### **Mesures d'hygiène à prendre**

#### **Personnel éducatif :**

- Désinfecter systématiquement les jeux utilisés
- Se laver les mains avant et après chaque soin (repas et change)
- Se désinfecter les mains après chaque soin

#### **Enfant malade (dès le 1<sup>er</sup> cas)**

- Lui laver les mains aussi souvent que possible : entre chaque activité, repas, sieste, etc.
- Conjonctivite : rincer les yeux avec du sérum et des compresses de gaze stérile.
- Désinfecter les jeux qu'il utilise
- **Info : le liquide émanent des yeux est contagieux**
- Gastro-entérite : laver et désinfecter les mains de l'enfant après chaque selle, désinfecter les toilettes ou table à langer, veiller à ce qu'il n'échange pas ses couverts, biberons, lolette, ou autres jeux portés à la bouche
- **Info : les selles sont contagieuses**

**Parent (dès 1<sup>er</sup> cas)**

- Angine à streptocoques et autres maladies contagieuses nécessitant un traitement pas antibiothérapie : le mentionner à chaque parent d'enfant malade.
- Poux demander à chaque parent de contrôler régulièrement son enfant et au besoin de lui faire un shampoing avant son retour à la crèche (s'en assurer quand l'enfant revient)

**Personnel :**

- Mentionner chaque cas de maladie contagieuse nécessitant une antibiothérapie
- Informer dès que 3 cas de maladie similaire se présentent dans l'ensemble de l'institution.

**Ce document a été établi en collaboration avec le Dr. Arana, pédiatre référent de la crèche.**